

予防接種スケジュール

【医療関係者用】日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2026年4月1日版 日本小児科学会



ワクチン		種類	母子 免疫 (妊娠中)	乳児期									幼児期					学童期／思春期													
				生 直 後	6 週	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9-11 か 月	12-15 か 月	16-17 か 月	18-23 か 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10歳以上						
RSウイルス		母子免疫	不活化	(注1)																											
B型肝炎		ユニバーサル	不活化				①	②				③		(注2)																	
		母子感染予防			①	②				③																					
ロタウイルス		1価	生				①	②	(注3)																						
		5価					①	②	③	(注4)																					
肺炎球菌 (PCV15、PCV20)			不活化				①	②	③					④						(注5)											
5種混合 (DPT-IPV-Hib)			不活化				①	②	③					④				7.5歳まで	15歳未満まで使用可能												
3種混合 (DPT)			不活化	(注6)														① (注7)			(注8)		(注11-12)								
2種混合 (DT)			不活化																			①11歳	12歳								
ポリオ (IPV)			不活化															① (注9)													
インフルエンザ菌b型 (ヒブ) ※アクトヒブ®で初回接種する場合			不活化				①	②	③					④						(注10)											
BCG			生							①																					
麻疹・風疹混合 (MR)			生											① (注11)				② (注11,12)													
水痘			生											①		②				(注13)											
おたふくかぜ			生											①				② (注14)													
日本脳炎			不活化								生後6か月から接種可能							① ②	③	7.5歳まで		④ 9-12歳									
不活化インフルエンザ			不活化								生後6か月から接種可能						毎年 (10、11月などに) ① ②						13歳以上①								
経鼻弱毒生インフルエンザ			生														2歳以上～19歳未満に		毎年 (10月、11月などに) ①						点鼻						
新型コロナ			mRNA								製剤により使用できる年齢が異なる																				
			不活化																												
ヒトパピローマ ウイルス (HPV)		女性	9価 (注15)	不活化																				小6	中1① ②	中2～高1相当 (注16)					
		男性	9価	不活化																					中1①② (注17,18)						
ワクチン		種類	母子 免疫 (妊娠中)	生 直 後	6 週	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9-11 か 月	12-15 か 月	16-17 か 月	18-23 か 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10歳以上						

定期接種の推奨期間
定期接種の接種可能な期間
任意接種の推奨期間
任意接種の接種可能な期間
添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
健康保険での接種時期